

Timpanoplastia

- 1.- Dieta normal después de las primeras 24h.
- 2.- Tratamiento farmacológico
 - analgésicos prescritos por el cirujano.
 - en algunas ocasiones se prescribe tratamiento antibiótico.
 - en algunas ocasiones se prescribe tratamiento antivertiginoso.
- 3.- El vendaje circular de la cabeza no debe manipularse ni mojarse hasta su retirada en la consulta.
- 4.- Una vez retirado el vendaje en la primera visita postoperatoria todavía deben quitarse los puntos/grapas que pueda haber en la herida y el taponamiento ótico. Esto se realizará en una segunda visita postoperatoria pasada la primera semana.
- 6.- Entra dentro de la normalidad:
 - dolor de cabeza (muchas veces por la presión del propio vendaje).
 - sensación de mareo e incluso vértigo rotatorio con náuseas o vómitos los primeros 3-4 días. En este caso se recomienda reposo y tratamiento antivertiginoso.
 - supuración ótica a través del tapón una vez retirado el vendaje.
 - una vez retirado el taponamiento ótico puede haber también supuración y sensación de oído tapado. Éstas pueden mantenerse durante las primeras 3-4 semanas postoperatorias.
 - desplazamiento del pavellón auricular hacia fuera que se corregirá espontáneamente en pocas semanas.
- 7.- Debe consultar con el médico o con un servicio de urgencias en caso de:
 - vértigo severo con náuseas/vómitos pasados los tres primeros días de la cirugía.
 - sangrado ótico persistente.
 - síntomas de parálisis facial (desviación de la comisura labial, imposibilidad de arrugar la frente o de cerrar el párpado, etc.)